

<p style="text-align: center;"><b>Flixabi 100 mg</b> infliximab</p> <p style="text-align: center;"><b>Patiëntenherinneringskaart</b></p> <p>Naam patiënt: Naam arts: Telefoonnummer arts:</p> <p>Deze patiëntenherinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens de behandeling met Flixabi.</p> <p>Toon deze kaart aan alle artsen die bij uw behandeling betrokken zijn.</p> <p>Lees de bijsluiter van Flixabi zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.</p> <p>Aanvangsdatum Flixabi-behandeling:</p> <p>Huidige toedieningen:</p> <p>Het is belangrijk dat u en uw arts de merknaam en het partijnummer van uw geneesmiddelen noteren.</p> <p>Vraag uw arts het type en de datum van de laatste tuberculose (tbc)-controle(s) hieronder te noteren:</p> <p>Onderzoek: Datum: Uitslag:</p> <p>Zorg ervoor dat u bij elk bezoek aan een zorgverlener ook een lijst meebrengt van alle andere medicijnen die u gebruikt.</p> <p>Lijst van allergieën:</p> <p>Lijst van andere geneesmiddelen:</p>	<p><b>Infecties</b></p> <p><b>Vóór de behandeling met Flixabi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht uw arts in als u een infectie heeft, ook als het er een van zeer geringe ernst is.</li> <li>• Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tbc heeft gehad, en of u in contact bent gekomen met iemand die tbc had. Uw arts zal u onderzoeken om vast te stellen of u tbc heeft. Vraag uw arts het type en de datum van uw laatste tbc-controle(s) op de kaart te noteren.</li> <li>• Licht uw arts in als u hepatitis B heeft, of als u weet of vermoedt een drager van het hepatitis B-virus te zijn.</li> </ul> <p><b>Tijdens de behandeling met Flixabi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht uw arts onmiddellijk in als u tekenen van infectie vertoont. Zulke tekenen kunnen zijn: koorts, vermoeidheid, (hardnekkig) hoesten, kortademigheid, gewichtsverlies, nachtelijk transpireren, diarree, wonden, tandpijn, een brandend gevoel bij het urineren of ‘griepachtige’ verschijnselen.</li> </ul> <p><b>Zwangerschap en vaccinaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u Flixabi heeft gekregen terwijl u zwanger was, is het belangrijk dat u dit aan de arts van uw baby vertelt voordat uw baby een vaccin krijgt. Uw baby mag binnen 6 maanden na de geboorte geen ‘levend vaccin’ krijgen, zoals BCG (gebruikt om tuberculose te voorkomen)</li> </ul> <p>Bewaar deze kaart nog vier maanden na uw dosis Flixabi, of in geval van zwangerschap ten minste 6 maanden na de geboorte van uw baby. Er kunnen bijwerkingen optreden tot lang na uw laatste dosis.</p>
---	---