

Patiëntenwaarschuwingskaart
Benepali
Etanercept

Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u Benepali krijgt toegediend en tijdens de behandeling met Benepali. Als u deze informatie niet begrijpt, vraag uw arts dan om uitleg.

- Toon deze kaart aan artsen die bij de behandeling van u of uw kind zijn betrokken.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Benepali is niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten die minder dan 62,5 kg wegen. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Infecties

Benepali kan de kans dat u een ernstige infectie krijgt verhogen.

- U mag Benepali niet gebruiken als u een infectie heeft. Als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw arts.
- Als u symptomen krijgt die op een infectie kunnen wijzen, zoals koorts, aanhoudend hoesten, gewichtsverlies of lusteloosheid, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- U dient onderzocht te worden op tuberculose (TBC). Vraag uw arts om de data en uitslagen van uw laatste onderzoek op TBC hieronder te noteren:

Test: _____ Test: _____

Datum: _____ Datum: _____

Uitslagen: _____ Uitslagen: _____

- Vraag uw arts om andere geneesmiddelen te noteren die uw kans op een infectie kunnen vergroten.

Congestief hartfalen

- Als u congestief hartfalen heeft, en u denkt dat uw symptomen (zoals kortademigheid of zwelling van de voeten) erger worden of als u dergelijke symptomen voor het eerst krijgt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Andere informatie (a.u.b. invullen)

Naam van patiënt: _____

Naam van arts: _____

Telefoon van arts: _____

- Draag deze kaart gedurende 2 maanden na de laatste dosis Benepali bij u, omdat bijwerkingen op kunnen treden na uw laatste dosis Benepali.