

**Patiëntenwaarschuwingskaart**  
**Benepali**  
**Etanercept**

Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u Benepali krijgt toegediend en tijdens de behandeling met Benepali. Als u deze informatie niet begrijpt, vraag uw arts dan om uitleg.

- Toon deze kaart aan artsen die bij de behandeling van u of uw kind zijn betrokken.

**Gebruik bij kinderen en adolescenten**

Benepali is niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten die minder dan 62,5 kg wegen. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

**Infecties**

Benepali kan de kans dat u een ernstige infectie krijgt verhogen.

- U mag Benepali niet gebruiken als u een infectie heeft. Als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw arts.
- Als u symptomen krijgt die op een infectie kunnen wijzen, zoals koorts, aanhoudend hoesten, gewichtsverlies of lusteloosheid, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- U dient onderzocht te worden op tuberculose (TBC). Vraag uw arts om de data en uitslagen van uw laatste onderzoek op TBC hieronder te noteren:

Test: \_\_\_\_\_ Test: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Uitslagen: \_\_\_\_\_ Uitslagen: \_\_\_\_\_

- Vraag uw arts om andere geneesmiddelen te noteren die uw kans op een infectie kunnen vergroten.

_____	_____
_____	_____
_____	_____

**Congestief hartfalen**

- Als u congestief hartfalen heeft, en u denkt dat uw symptomen (zoals kortademigheid of zwelling van de voeten) erger worden of als u dergelijke symptomen voor het eerst krijgt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

**Andere informatie (a.u.b. invullen)**

Naam van patiënt: \_\_\_\_\_

Naam van arts: \_\_\_\_\_

Telefoon van arts: \_\_\_\_\_

- Draag deze kaart gedurende 2 maanden na de laatste dosis Benepali bij u, omdat bijwerkingen op kunnen treden na uw laatste dosis Benepali.