

 **BENEPALI®**

**SNELGIDS**

---

**Benepali®  
Voorgevulde  
injectiespuit**

 **Benepali®**

(PFSyringe) NL v3.0  
Goedgekeurd: 04/2019

## A. Voordat u begint

### Verzamel uw benodigdheden

Gebruik een schoon en goed verlicht oppervlak en leg het volgende klaar:



De verpakking bevat niet:

1 alcoholgaasje



Wattenbol of gaasje




Afvalcontainer voor scherpe materialen

### Een nieuwe Benepali® voorgevulde injectiespuit

Een voorgevulde injectiespuit voor eenmalig gebruik

**Niet schudden** met de voorgevulde injectiespuit.



### 1. Inspecteer de voorgevulde injectiespuit:

Controleer de houdbaarheidsdatum op het etiket van de voorgevulde injectiespuit.

**Gebruik** de voorgevulde injectiespuit **niet** als de houdbaarheidsdatum is verlopen.

**Gebruik** de voorgevulde injectiespuit **niet** als deze op een harde ondergrond is gevallen. Daarbij kunnen onderdelen in de voorgevulde injectiespuit beschadigd zijn geraakt.

**Gebruik** de voorgevulde injectiespuit **niet** als de naaldbeschermer ontbreekt of niet goed vast zit.

### 2. Inspecteer de oplossing:

Bekijk het medicijn in de voorgevulde injectiespuit.

Het medicijn moet helder of licht melkachtig, kleurloos of lichtgeel zijn, en kan kleine witte of bijna doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten.

**Gebruik** de oplossing **niet** als deze verkleurd of troebel is, of als er andere deeltjes aanwezig zijn dan zoals hierboven wordt beschreven.

### 3. Laat het medicijn op kamertemperatuur komen:

Haal één voorgevulde injectiespuit uit de koelkast en laat deze minimaal 30 minuten op temperatuur komen voordat u de injectie toedient.

Dit is belangrijk, omdat dit het injecteren van het geneesmiddel eenvoudiger en comfortabeler maakt.

**Verwijder** de naaldbeschermer **niet** totdat u klaar bent om de injectie toe te dienen.

**Gebruik geen** warmtebronnen, zoals een magnetron of heet water, om Benepali® op te warmen.

### 4. Kies de injectieplek:

De voorgevulde injectiespuit van Benepali® is bedoeld voor onderhuidse injectie. Deze dient te worden geïnjecteerd in de dij, buik of achterzijde van de bovenarm (zie afbeelding links).

Wissel de injectieplek bij elke injectie.

Indien u in de buik injecteert, doe dit dan minimaal 5 cm vanaf de navel.


**Injecteer niet** op plekken die rood, hard, gekneusd of gevoelig zijn.

**Injecteer niet** in littekens of striae.

Als u psoriasis hebt, injecteer dan **niet** in verheven, dikke, rode of schilferige huidplekken of laesies.


## B. Injectiestappen

### Stap 1:



Was uw handen met water en zeep.

### Stap 2:




Veeg over de injectieplek met een alcoholgaasje.

Raadpleeg 'Kies de injectieplek' voor hulp bij het kiezen van een injectieplek.

Raak dit gebied **niet** meer aan vóór het zetten van de injectie.

### Stap 3:



Verwijder de naaldbeschermer rechtstandig en gooi deze weg in de prullenbak of afvalcontainer voor scherpe materialen.


Raadpleeg 'Kies de injectieplek' voor hulp bij het kiezen van een injectieplek.

Draai of buig de naaldbeschermer **niet** tijdens het verwijderen, omdat de naald daardoor beschadigd kan raken.

Raak het buisje van de zuiger **niet** aan bij het verwijderen van de naaldbeschermer.

**De dop nooit terug op de naald plaatsen.**


### Stap 4:



Pak voorzichtig een stuk huid vast op de schoongemaakte injectieplek. Houd de voorgevulde injectiespuit op 45 graden ten opzichte van de huid. Steek de naald met een prikkende beweging volledig in de huid.


U kunt de huid loslaten, zodra de naald geheel in de huid is gestoken.

### Stap 5:



Duw de zuiger langzaam naar beneden om de gehele Benepali®-oplossing te injecteren.

### Stap 6:



Zodra de injectiespuit leeg is, haalt u de naald uit de huid met dezelfde hoek als bij het inbrengen.

De dop **nooit** terug op de naald plaatsen. Door het terugplaatsen van de dop kunt u zich per ongeluk prikken.

### Verwijderen:



Gooi de gehele injectiespuit in een goedgekeurde afvalcontainer voor scherpe materialen.

Vraag uw zorgverlener hoe u het beste een volle afvalcontainer voor scherpe materialen kunt afvoeren. Afvalcontainers voor scherpe materialen zijn te koop bij uw plaatselijke apotheek.

Gooi de inhoud van deze container **niet** bij het huishoudelijk afval.

**Niet** recycleren.

**Niet** nogmaals gebruik maken van dezelfde voorgevulde Benepali®-injectiespuit.

**Bewaar de container altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.**

## C. Injectieplekverzorging

Als er op de injectieplek een bloeding optreedt, druk dan een wattenbol of gaasje op de injectieplek.

**Wrijf niet** over de injectieplek.

Indien nodig kunt u een pleister op de injectieplek plakken.



### Vragen?

Overleg met uw arts of verpleegkundige.

Raadpleeg uw **gebruiksaanwijzing**.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door elke bijwerking die u ondervindt te melden. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staat vermeld op de verpakking en in de bijsluiter.

Lees de **gebruiksaanwijzing** voorafgaand aan het gebruik van Benepali® en bij iedere keer dat u een herhaalrecept krijgt. Deze kan nieuwe of gewijzigde informatie bevatten. Deze **snelgids** is niet bedoeld om deze instructies te vervangen.

**Probeer niet** uzelf te injecteren, tenzij u van uw arts of verpleegkundige uitleg hebt gehad over hoe u de injectie moet toedienen.

(PFSyringe) NL v3.0  
Goedgekeurd: 04/2019

