

TYSABRI®

WAARSCHUWINGSKAART VOOR PATIËNTEN



Naam van de patiënt: _____

Naam van de arts: _____

Telefoonnummer van de arts: _____

Deze waarschuwingskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waar u vóór en tijdens uw behandeling met TYSABRI van op de hoogte moet zijn.

- Toon deze kaart aan elke arts die bij uw behandeling betrokken is, niet alleen aan de neuroloog.
- Lees de TYSABRI-bijsluiter zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Houd deze kaart bij u tot 6 maanden na de laatste dosis TYSABRI, omdat er zelfs nadat u met de behandeling met TYSABRI bent gestopt bijwerkingen kunnen optreden.
- Toon deze kaart aan uw partner of verzorger. Het is mogelijk dat zij symptomen van PML opmerken die u zelf niet bemerkt hebt, zoals verandering van stemming of gedrag, vermindering van het geheugen, spraak- en communicatieproblemen.

Voorafgaand aan behandeling met TYSABRI

- U mag niet met TYSABRI worden behandeld als u een ernstig probleem heeft met uw immuunsysteem.
- U mag tijdens het gebruik van TYSABRI niet langdurig een ander geneesmiddel dat werkt, op het immuunsysteem voor uw multiple sclerose, gebruiken.



Tijdens behandeling met TYSABRI

Progressieve Multifocale Leukoencephalopathie (PML)

PML, een zeldzame herseninfectie, is opgetreden bij patiënten die met TYSABRI werden behandeld. PML leidt doorgaans tot ernstige invaliditeit of overlijden.

Het risico op PML lijkt toe te nemen met de behandelingsduur, met name na 2 jaar.

De symptomen van PML kunnen vergelijkbaar zijn aan die van een MS-schub. Indien u gelooft dat uw MS verslechtert, of als u nieuwe symptomen opmerkt, dan is het belangrijk dat u hier zo snel mogelijk met uw arts over praat. In het algemeen ontwikkelen de symptomen van PML zich langzamer (meestal over een aantal dagen tot weken) dan de symptomen behorende bij een MS schub. De symptomen kunnen vergelijkbaar zijn met uw MS.

Aanwijzingen kunnen zijn:

- veranderingen in concentratie en mentale vermogens,
- veranderingen in gedrag,
- krachteloosheid aan één kant van het lichaam,
- problemen met het gezichtsvermogen,
- nieuwe neurologische symptomen die u nog niet eerder heeft bemerkt.

Het behandelen van PML vereist het verwijderen van TYSABRI uit uw bloed, meestal gebeurt dit door middel van zgn. plasmaferese. Een aantal dagen tot weken na de behandeling van PML kan bij patiënten met PML een ernstige onstekingsreactie, genaamd IRIS, optreden. IRIS kan leiden tot diverse symptomen waaronder verslechtering van de hersenfunctie.

Ernstige infecties

Andere ernstige infecties kunnen optreden bij de behandeling met TYSABRI. Wanneer u denkt dat u een ernstige, aanhoudende infectie heeft zoals bijvoorbeeld aanhoudende koorts, dan is het belangrijk dat u hier zo snel mogelijk met uw dokter over spreekt.